



BIEN VIVRE ENSEMBLE

PROCESS A SUIVRE POUR LA TRACABILITE DES CAS COVID-19

DEFINITIONS :

➤ **Cas confirmé** : personne, symptomatique ou non, avec un résultat de test RT-PCR confirmant l'infection par le SARS-CoV-2.

➤ **Contact à risque**

Personne ayant eu un contact direct avec un cas confirmé sans protection efficace (masque, séparation physique (hygiaphone, vitre, plexiglas) dans les situations suivantes :

- Etudiant ou enseignant de la même classe ou même groupe.
- Personne partageant le même lieu de vie que le cas confirmé ou probable.
- Personne partageant un espace confiné (bureau ou salle de réunion, véhicule...) pendant au moins 15 minutes avec un cas confirmé, ou étant restée en face à face avec un cas durant plusieurs épisodes de toux ou d'éternuement.
- Personne ayant eu un contact direct avec un cas confirmé sans protection en face à face, quelle que soit la durée.

➤ **Cas possible**

Personne présentant des signes cliniques évocateurs de la Covid-19, ayant ou non été en contact à risque avec un cas confirmé dans les 14 jours précédant l'apparition des symptômes, et pour laquelle un test RT-PCR est prescrit par un médecin.

TRACABILITE DES CAS

Les composantes désignent un **relais Covid** qui transmet tous les cas identifiés possibles, probables, confirmés au référent Covid désigné pour l'établissement quel que soit leur statut (personnel, enseignants, étudiant, ...).

Le relais Covid de la composante identifiée en lien avec le référent Covid la liste des contacts à risque et informe ces personnes de la conduite à tenir selon le tableau ci-dessus.

Le référent Covid informe les médecins du SUMPP et le Vice-Président santé des cas confirmé, et fait le lien avec l'ARS pour le suivi de ces éléments afin de réagir au plus tôt en cas d'apparition d'un cluster (au moins 3 cas confirmés ayant été en contact entre eux et survenus dans une période de 7 jours).

CONDUITE A TENIR DEVANT DES CAS DE COVID SIGNALES

	Conduite à tenir	Résultat test antigénique	Test RT-PCR	Résultat du test RT-PCR	Suite à donner
Personne présentant des symptômes	Isolement immédiat		Immédiat	Négatif Positif	Arrêt de l'isolement Arrêt de l'isolement à J+10 si disparition des symptômes. Si fièvre à J+10, poursuite de l'isolement jusqu'à 48h après la fin de la fièvre.
Test Antigénique ou RT-PCR chez une personne asymptomatique	Isolement immédiat			Positif	Arrêt de l'isolement à J+10, poursuite de l'isolement jusqu'à 48h après la fin de la fièvre.
Personne contact à risque hors foyer	Isolement et test antigénique immédiat	Résultat négatif	Test à J+7 et transmission du résultat	Négatif	Arrêt de l'isolement
				positif	Poursuite de l'isolement 10 jours supplémentaires, puis, si fièvre, jusqu'à 48h après la fin de la fièvre.
			En l'absence de test à J+7		Poursuite de l'isolement pendant 7 jours.
		Résultat positif			Poursuite de l'isolement pendant 10 jours. Si fièvre à J+10, poursuite de l'isolement jusqu'à 48h après la fin de la fièvre.
Personne contact à risque du foyer	Isolement et test antigénique immédiat	Résultat négatif	Test à J+7 après la guérison du cas confirmé (soit J+17)	Négatif	Arrêt de l'isolement
				Positif	Poursuite de l'isolement 10 jours supplémentaires, puis, si fièvre, jusqu'à 48h après la fin de la fièvre.
		Résultat positif			Poursuite de l'isolement pendant 10 jours. Si fièvre à J+10, poursuite de l'isolement jusqu'à 48h après la fin de la fièvre.

Pendant la semaine qui suit la sortie d'isolement, le port du masque (chirurgical pour les cas), les mesures d'hygiène et la distanciation physique doivent être respectés scrupuleusement, et tout contact avec des personnes à risque de forme grave doit être évité.